

MIS AMIGOS DEL SUELO DEL BOSQUE

Sapo excavador

Rhinophrynus dorsalis

Familia: Rhinophrynidae

Características: Es un anfibio con cabeza pequeña y triangular. Pasa mucho tiempo enterrada y es muy difícil verla en la superficie. Es posible escucharlos emitir un fuerte sonido como uooooooooo. Este canto es muy particular y se puede escuchar a grandes distancias.



Sapo gigante

Rhinella marina

Familia: Bufonidae

Características: Este sapo es un anfibio de una especie antigua. Es muy grande y le gusta inflarse tanto como puede para verse aún más grande. Este anfibio posee grandes glándulas venenosas y al ser ingeridos, son altamente tóxicos para la mayoría de los animales.



Aguties

Dasyprocta punctata

Familia: Dasyproctidae

Características: Este roedor se alimentan de frutos y semillas. Acostumbra a enterrar semillas cada vez que se alimenta, para comerlas cuando hay escasez ayudando sin querer a que crezcan más árboles y plantas.



Taltuza

Orthogeomys grandis

Familia: Geomyidae

Características: Vive bajo tierra en túneles que excava, la mayoría de las taltuza poseen pelo marrón u otro color que a menudo coincide con el color del suelo en el que viven. Tienen grandes mejillas como bolsitas.



Tepezcuintle

Cuniculus paca

Familia: Cuniculidae

Características: Este roedor tiene hábitos nocturnos, se alimenta de vegetales y semillas. Le gusta pasar el día en su madriguera. Tiene un gran parecido a el agutí pero son especies diferentes.



Armadillo

Dasypus novemcinctus

Familia: Dasypodidae

Características: Distinguibles por tener una armadura formada por placas óseas cubiertas por escudos córneos que les sirven como protección. Los mayas modernos relacionan al armadillo con buena suerte.



NUESTROS AMIGOS DEL SUELO SON LOS ¡JARDINEROS DEL BOSQUE!

Los animales del suelo son grandes jardineros, ellos comen el fruto de las plantas, se trasladan y luego las defecan. Esto permite que las semillas se reproduzcan y crezcan nuevas plantas, en lugares nuevos.

La dispersión de las semillas

La dispersión de semillas por parte de los animales se presenta en dos tipos: **exozoocoria**, que consiste en la adhesión de semillas al pelaje o plumaje de animales; y **endozoocoria**, que consiste directamente en su ingestión.



exozoocoria



endozoocoria

